王氏醫案

古王者慮民之疾痛夭札也而設醫官予之祿使士人爲之綦善也降自後世民不聊生於是去而爲醫以餬余口問之醫蓋茫如此非生民之灾乎孟英志古之士也尊甫[illegible]滄先生喜施予捐館之日家赤貧賴母夫人以儉勤支拄孟英孤露輒思自異精於醫非所志也故嘗披覽墳素慨慕古人落落自喜其胸次有如此而余則覵其處己之私有較然不欺者如與弟同財事母無私蓄交友不負平生之言數端者於古人爲難其他隱德細行可無論也今年春兒婦產後病劇諸醫罔效孟英自江右歸而五閱月之錮恙以釋夫自來操術之奇或富有著述或

獨行堪師見諸志乘者代不過數人若孟英兼而有之其必傳無疑顧予獨慨乎今之世去古日遠而士之有志於古者不能不挾術以與今遊則幾何而不以今之醫溷之也然則孟英亦慎持此志乎哉孟英向有回春錄醫案行世張君柳吟復輯近案名曰仁術志余忝與其事今將續梓謹以余所知其人者錄其大槩焉以序庚戌七月仁和趙夢齡

醫之道難言矣非有絕人之智則不克徹其精深非有濟世之仁則不肯殫其心力仁且智矣而無著述以傳則澤及一時而勿能垂百世此軒岐所以有著述也古者醫必三世治尙十全醫者皆深通是道故內經之書簡奧不繁至漢張機始備方至宋許叔微始有醫案由後世以醫爲市業者多而知者愈少不得不詳述醫案俾循途不悞亦仁人之用心也叔微之後張杲有醫說明孫泰來輯其父一奎之治驗陳桷記其師汪機之治驗並爲醫案江瓘復有名醫類案　國朝魏之琇續之此皆宅心仁智非炫世弋名者故其書至今重焉余家杭州五十載閱

醫多矣求其能通內經者蓋尠能自述其治驗者則未嘗有也後交王君孟英而得見其書心竊異之今聞楊君素園將爲續梓余不知孟英之學于仲景何如也若以繼叔微諸君之書誠無愧矣故爲之序孟英內行之篤治術之精已見楊趙序中不復贅云庚戌七月既望秀水莊仲方

例言

一孟英醫案周氏采自甲申迄於癸卯凡二十年治驗僅得二卷其遺漏必多然不遑補輯兹起甲辰仍仿編年之例以便逐年采續

一詳載姓字信而可徵此前例當遵非浪費筆墨第見聞有限難免遺珠還望四方同志廣爲蒐羅也

一回春錄所載雜證之案爲多感證之案間及而已良以感證方治每多相似周氏不諳斯道諒難鑒別而孟英於內傷外感無所不長至於治溫尤推巨擘兹編於溫證治案不忍多

刪讀者須於大同小異之中澄心研究自可悟其微妙也

一孟英之案不徒以某方治愈某病而已或議病或辨證或論方藥或談四診至理名言隨處闡發或繁或簡或淺或深別有會心俱宜細玩

一案中有直用古方者是胸有成竹信手拈來頭頭是道也有不用古方之藥而用其意者蓋用藥如用兵不能執死方以治活病也有竟不用古方者乃良藥期於利濟不必期於古方也苟非讀書多而融會貫通於其心奚能辨證清而神明化裁出其手天機活潑生面別開不媿名數一家道行千里

矣

一同人輯此原爲開醫家之智慧擴病者之生機非有利心翻刻不究但須校對眞確庶不貽誤後人

甲辰春予館於蘇撫孫賓谷親家署中偶見回春錄二卷乃吾畏友王君之醫案也亟爲卒讀因歎孟英抱用世之才工壽世之術周君輯而存之其功大矣其傳必矣或疑案中多引而未發之言似非嘉惠來茲之道余謂不然夫醫者意也昔人云吾意所解口不能宣詎有所吝而不言耶錄其已言垂爲後世法輯案者之意也求所未言嘿契作者意讀案者之法也試以此質之孟英必以余爲善讀焉後之覽者將更有好學深思心知其意而爲之注釋其書神明其法以宏其壽世之道奚止善讀如余而已哉惟余老矣沒世無稱聖人所疾羨周君之先我著

鞭敢不勉爲追步以期附驥而彰爰采今年耳目所及之如干案志諸剞劂且回春之名似與萬病回春相襲乃題其篇曰仁術志袁子所謂堯舜之政周孔之教神農之藥皆術也皆所以行其仁也推廣仁術是所望於續刻之君子

浙西王士雄孟英醫案　　山左張　鴻柳吟甫輯

高若舟偶患腹脹醫投溫運漸至有形如痞時欲衝逆吐酸益信爲虛寒之疾溫補之藥備嘗飲食日減其痞日增肌肉漸消臥榻半載甲辰春延孟英診脈沈弦而耎滑大解不暢小溲渾短苔色黃膩乃肝鬱氣結鬱則生熱補則凝痰與卮楝萸連元胡烏藥旋枳鷄金鼈甲茹橘苓夏等藥服之證雖遞減時發寒

乃氣鬱而欲伸之象　此少陽

熱四肢痠痛或疑爲瘧孟英曰此氣機宣達鬱熱外泄病之出

路豈可截乎參以秦艽柴胡豆卷羚羊蠶砂桑枝之類迎而導清熱滌飲宣達氣機尤屬合法之人皆疑久病元虛藥過凉散而若舟堅信不疑孟英識定不惑寒熱漸息攻衝亦止按其腹尚堅硬時以龍薈滾痰丸緩導然藥雖投法之飲食遞加漸次向愈若舟善作隷因集詩品書一聯以贈孟英云古鏡照神是有眞宰明漪絕底如見道心蓋頌其隔垣之視也

趙聽樵室高若舟之妹也去冬偶患脘痛黄某治之漸增頭疼脘痛而過投香燥亦能致此證又誤投溫補乎眩暈氣逆嘔吐痰多不寐便溏不食經事不行始謂其虛三月後又疑爲娠諸藥徧試病日以進若舟延孟英脈之左絃而數

右滑以駛。曰病藥耳。旬餘可瘳。趙疑大病小覷。不服其方。越半月病者頸𩑶頭難舉。醫謂天柱已倒。勢無望矣。若舟聞之。復懇援於孟英。疏方仍是前診之法。趙問此病諸醫束手。大劑補藥尙無寸效。而君兩次用藥。皆極清淡。雖分兩頗重。亦焉能有濟乎。孟英曰。子何愚耶。藥惟對證。乃克愈病。病未去而補之。是助桀也。病日加。而補益峻。是速死也。原彼初意。非欲以藥殺人。總緣醫理未明。世故先熟。不須辨證。補可媚人。病家雖死不怨。醫者至老無聞。一唱百和。孰能挽此頹風。令壼體質雖豐。而陰虛有素。是以木少水涵。肝陽偏盛。上侮於胃。則爲脘痛。斯時投以

葉氏獨得之秘

酸苦泄肝甘凉養胃數日而愈矣乃温補妄施油添火上肺津胃液灼爍無餘怒木直升樞機窒塞水飲入胃凝結爲痰雖見證多端皆氣失下降豈可指眠食廢以爲勞月汛爽而爲妊耶予以大劑輕淡之品肅清氣道俾一身治節之令肝膽逆升之火胃府逗留之濁樞機鬱遏之熱水飲凝滯之痰咸得下趨自可向愈不必矯枉過正而妄以硝黃傷正氣所謂藥貴對證而重病有輕取之法非敢藐視人命故將疲藥塞責也趙極感悟投匕卽效踰旬果安又一月經至嗣與滋養康復如常越二載又病復惑於黃某而孟英之功盡墮惜哉

發熱惡寒頭疼
自汗皆桂枝證
此人必津液素
[illegible]汗出而發
[illegible]故肝失
[illegible]而上衝肺
[illegible]之所發而口
渴也

馬某年三十餘。素用力。患發熱惡寒。肢振自汗。少腹氣上衝胸。頭疼口渴。孟英診曰。衛虛風襲。而絡脈久傷。肝風內動。與建中（建中之力在飴餹。今去飴。仍是桂枝湯。）去餳加龍牡石英蓯蓉楝實桑枝。數帖而痊。

李燕標參戎。於癸夏將欲赴都。館於石北涯家。項後患疽。外科僉云不治。孟英薦老醫朱嵩年療之。漸安。孟英偶診其脈。謂北涯曰。李證有可愈之機。脈難久享其年。北涯驚問所以。孟英曰。左尺堅搏。眞陰已傷。非善象也。既而告痊北上。今春果卒於京。

李叟年越古稀。意欲納妾。雖露其情。而子孫以其耄且瞽也。不敢從。因此漸病狂惑。羣醫咸謂神志不足。廣投熱補之藥。愈服

愈劇始延孟英診之脈勁搏指面赤不言口涎自流力大無制曰此稟賦過強陽氣偏盛姑勿論其脈證卽起病一端概可見矣如果命門火衰早已痿靡不振焉能興此念頭醫見其老輒疑其虛須知根本不堅實者不能享長年旣享大壽其得於天者必厚況人年五十陰氣先衰徐靈胎所謂千年之木往往自焚陰盡火炎萬物皆然去冬吾治邵可亭孤陽喘逆壯水清火之外天生甘露飲灌至二百餘斤卽梨汁也病已漸平僅誤於兩殘蠶湯前功盡墮可見陰難充長火易燎原今附桂仙茅鹿茸參戟河車等藥服之已久更將何物以生其涸竭之水而和

此四損證之最重者治稍不善議論紛如便不可保此案深可爲法

其亢極之陽乎尋果不起

程變庭乃郎芷香今春病温而精關不固旬日後陡然莖縮寒顫自問不支人皆謂爲虛寒欲投參附孟英曰非寒也平日體豐多溼厚味醲痰是以苔膩不渴善噫易吐而吸受風温卽以痰溼爲山險乘其陰虧陽擾流入厥陰甚易豈容再投温補以刦液錮邪而速其痙厥耶伊家以六代單傳父母深憂之堅求良治孟英曰予雖洞識其證而病情轇轕縱有妙劑難許速功治法稍乖亦防延損雖主人篤信我有堅持恐病不卽瘳必招物議中途岐惑其過誰歸倘信吾言當邀顧聽泉會診旣可匡

予之不逮。卽以杜人之妄議。程深然之。於是王顧孰籌妥治。午後進肅清肺胃方。以解客邪。蠲痰涎而斡樞機。早晨投涼腎舒肝法。以靖浮越。搜隧絡而守關鍵。病果遞減。奈善生嗔怒。易招外感。不甘澹泊。反復多次。每復必瑟縮寒顫。甚至齒縫見紫血瓣。指甲有微紅色。溺短而渾黑極臭。孟英曰。幸上焦已清。中樞已運。亟宜填腎陰。清肝熱。以西洋參。二冬。二地。蓯蓉。花粉。知。蘗。連。楝。斛。芍。石英。牡蠣。龜板。鼈甲。阿膠。雞子黃之類。相迭爲方。大劑連服二十餘帖。各恙漸退。繼以此藥熬膏晨服。午用繆氏資生丸方。各品不炒。皆生曬研末。竹瀝爲丸。枇杷葉湯送下。服至

凡痰飲內盛之人服寒熱藥皆如石投水人皆以爲稟賦之異不知皆痰飲爲患也

入秋始得康健孟英曰古人丸藥皆用蜜最屬無謂宜各因其證而變通之此其一法也

翁嘉順室娩後發熱竹林寺僧治之不應溫龔二醫皆主生化湯加減病益劇請孟英診之脈弦滑微數曰素體陰虧熱自內生新產血去是以發熱惟譫妄昏瞀最是嚇醫之證渴喜熱飲宛似虛寒之據宜其猜風寒而表散疑瘀血以攻通帖帖炮薑人人桃桂陰愈受劫病乃日加幸而痰飲內盛津液未致涸竭與蠲飲六神湯去橘半加西洋參生地花粉竹茹知母生白芍爲劑數日而瘳逾旬復發熱或疑涼藥之弊或謂產蓐成勞衆

楚咻之病漸進矣其小姑適吳氏者向役於冥曹俗謂之活無常偶來探病忽仆地而僵口中喃喃或問汝嫂病何如答云須服王先生藥人皆異之次日仍乞診於孟英曰脈浮數而弦是風溫也與前病異便瀉無溺肺熱所迫大渴無苔胃汁受爍亟與天生建中湯頻灌即蔗汁也藥主大劑甘涼果得津回舌潤漸以痊可病染於姑孟英診曰高年陰氣太虧邪氣偏盛玉版論要云病溫虛甚死言人之眞陰甚虛曷足以禦邪熱而息燎原可虞在兩候之期乎至十四天果殞而嘉順亦染焉初發熱即舌赤而渴脈數且澀孟英曰非善證也蓋陰虛有素值憂勞

三江地氣卑溼天時溫暖傷寒之證絕少最多溼溫風溫之證又人體質柔脆不任峻猛之藥故惟以甘寒清解之劑漸次撥則斯邪去而正不傷若在北方剛堅之體此等藥雖服百劑亦若罔知非加硝黃峻猛邪終不去故吳氏之法施於江浙而吳氏之方馳名幽冀易地則皆然

衰痛之餘五志內燔溫邪外迫不必由衛及氣自氣而營急與清營繼投涼血病不稍減且家無主藥之人旁議譁然幸其舊工人陳七頗有膽識力懇手援孟英曰我腸最熱奈病來頗惡治雖合法勢必轉重若初起不先覷破早已殆矣吾若畏難推諉恐他手雖識其證亦無如此大劑車薪杯水何益於事吾且肩勞任怨殫心盡力以圖之病果日重昏瞀耳聾自利紅水目赤妄言孟英惟以晉三犀角地黃湯加銀花石膏知斛巵貝花粉蘭草菖蒲元參竹瀝竹茹竹葉鳧茈海蛇等出入互用至十餘劑舌上忽布穢濁垢苔口氣噴出臭難嚮邇手冷如冰頭面

亦智者之因地制宜也

自汗咸謂絕望矣孟英曰生機也彼陰虛熱邪深入予一以清營涼血之法服已逾旬始得營陰漸振推邪外出乃現此苔惟本元素弱不能戰解故顯肢冷而汗僅出於頭面非陽虛欲脫也復與甘寒頻灌越三日汗收熱退苔化肢溫自始迄終犀角共服三兩許未犯一毫相悖之藥且賴陳七恪誠始克起九死於一生繼以滋陰善後而康

翁嘉順之妹亦染病勢極危因役於冥曹自以為不起孟英曰年壯陰充藥治不謬焉能死乎昔人云見理明者陰陽五行不能拘吾當以理勝數遂按法治之病乃日減且慎寒暄節飲食

守禁忌調治二旬果然康健又其姑亦病溫初不服藥七日外始延孟英診之曰此病邪雖不盛第頻吐涎沫不能出口須以手撩不飲不食不便不眠或多言不倦或久問不答是七情鬱結氣久不舒津液凝痰邪得依附治之中肯尚難即愈不藥而待病從何去遂於清解方中寓蠲痰流氣通胃舒肝之品交十四日而熱退又數日痰沫漸少又旬日大解始行粥食日加而愈此治一法直貫到底不但不犯一分溫燥升補之藥而滋膩入血之品亦皆避之尙須三十劑奏績若病家不篤信醫者不堅持旁人多議論則焉克有濟耶然非乃媳前車之鑑亦未必

遠爾任賢不貳也

沈東屛年逾八秩患腹脹便祕孟英診曰耄年脈實天畀獨厚證屬陽結法宜清火與西洋參石膏白芍知母花粉桑皮杏仁橘皮枳殼甘草送更衣丸四劑而愈設投別藥勢必遷延而敗人亦謂其天年之得盡斷不料其藥治之誤也後四年始沒夏間汪湘筠明府因食肉病脹醫謂老年氣弱火衰輒投溫補直至腹如抱瓮始延孟英視之彌留已極不可救藥矣

顧石甫宰婁縣患恙醫治日劇解任歸求診於孟英脈見左寸如鉤曰病不能夏矣許子雙適至聞而疑之謂此證氣逆血溢

腹脹囊腫宛似上年康康侯之疾若以外象觀之似較輕爲胡彼可愈而此勿治耶孟英曰彼爲邪氣之壅塞脉雖怪而搏指不撓證實脉亦實也此爲眞氣之散漫脉來瞥瞥如羹上肥而左寸如鉤是心之眞藏見矣壅塞可以疏通散漫不能收拾客邪草木能攻神病刀圭莫濟證雖相似病判天淵縱有神丹終無裨也季春果歿

孫氏女年將及笄久患齒衄多醫莫療孟英診曰六脉緩滑天癸將至耳與丹參生地桃仁牛膝茯苓白薇滑石茺蔚子一劑知數日愈壽卽起汛略無他患

亦治偏盛之法

遂安余皆山貳尹起復赴都道出武林而患瘧范某云春寒所致用辛溫散之來某謂酒溼之痾治以五苓且雜參歸薑棗之類病乃日甚旬日後脘悶腹脹便祕氣逆躁渴自汗昏瞀不瞑亟迎孟英視之曰蘊溼固然而溫風外襲已從熱化何必夏秋始有熱瘧耶清解之法十劑可安服之果效旬日徑瘥

朱念民患泄瀉自謂春寒偶薄而飲燒酒次日轉爲滯下左腹起一痞塊痢時絞痛異常孟英曰陰虛木燥侮胃爲泄誤飲火酒怒木愈張非寒也亟屏辛溫之物用白頭翁湯加芩楝梔連海蛇銀花草決明枳椇子綠豆皮十餘劑而愈

此虛火上炎之證歸脾中參耆性皆上升故吐益甚易以引火歸原之法斯愈矣

鎖某弱冠吐血楊醫連進歸脾湯吐益甚孟英視之面有紅光脈形豁大因問曰足冷乎探之果然遂與六味地黃湯送飯丸肉桂心一錢覆杯而愈

沈裕昆室偶發脘痛范某與逍遙法痛頗止而發熱咽疼邀顧聽泉視之知感溫邪與清散法疼已而熱不退七日後目閉鼻塞耳聾肢搐不言語不飲食顧疑證險願質之孟英而沈之兩郎皆從王瘦石學因請決於師瘦石亦謂孟英識超我當爲汝致之時已薄暮乃飛刺追邀比孟英往診見其外候如是而左手診畢即縮去隨以右手出之遽曰非神昏也繼挖牙關察其

苔色白滑詢知大解未行曰病是風温然不逆傳膻中而順傳胃府證可無恐聽泉學問勝我知證有疑竇而虛心下問豈非胸襟過人處但温邪傳胃世所常有而此證如是駭人者因素有痰飲盤踞胃中外邪入之得以憑藉苔色之不形黃燥者亦此故耳不可誤認爲寒夫温爲熱邪脈象既形絃滑以數但令痰飲一降苔必轉黃此殆雲遮霧隱之時須具温太眞燃犀之照庶不爲病所欺且昔人於温證僅言逆傳不言順傳後世遂執定傷寒在足經温熱在手經不知經絡貫串豈容界限喻氏謂傷寒亦傳手經但足經先受之耳吾謂温熱亦傳足經但手

經先受之耳一隅三反既有其逆豈無其順蓋自肺之心包病機漸進而內陷故曰逆自肺之胃府病機欲出而下行故曰順今邪雖順傳欲出未能所謂胃病則九竅不和與逆傳神昏之犀角地黃湯證大相徑庭郭雲臺云胃實不和投滾痰而非峻可謂治斯疾之眞詮遂疏小陷胸合蠲飲六神湯加枳樸以蘆菔煮水煎藥和入竹瀝一杯送下礞石滾痰丸四錢沈嫌藥峻似有難色孟英曰既患駭人之病必服駭人之藥藥不瞑眩厥疾勿瘳盍再質之瘦石聽泉乎沈頷之王顧閱方僉以爲是且云如畏劑重陸續徐投可也翼日孟英與聽泉會診脈證不甚

減。詢知昨藥分數次而服。孟英曰。是勢分力緩之故也。今可釋疑急進。病必轉機。聽泉深然之。病家亦膽壯矣。如法服下。黎明果解膠韌痰穢數升。各恙即減。略吐語言。稍啜稀粥。苔轉黃燥。藥改輕清。漸以向安。嗣與育陰柔肝而愈。

朱氏婦素畏藥。雖極淡之品。服之即吐。近患晡寒夜熱。寢汗咽乾。咳嗽脇疼。月餘後漸至減餐經少。肌削神疲。始迓孟英診之。左手弦而數。右部濇且弱。曰既多怫鬱。又善思慮。所謂病發心脾是也。而平昔畏藥。豈可強藥再戕其胃。誠大窘事。再四思維。（妙想可以益人神智）以甘草小麥紅棗藕四味。令其煮湯頻飲勿輟。病者嘗藥大喜

昔余友彭香林患此證醫雖知其虛而治不如法竟以不起今讀此案彌增惋歎

徑日夜服之踰旬復診脈證大減其家請更方孟英曰毋庸此本仲聖治藏燥之妙劑吾以紅棗易大棗取其色赤補心氣香悅胃加藕以舒鬱怡情合之甘麥並能益氣養血潤燥緩急雖若平淡無奇而非惡劣損胃之比不妨久任胡可以果子藥而忽之哉恪守兩月病果霍然

江某年三十餘忽兩目發赤牙齦腫痛漸致狂妄奔走罵人不避親長其父皇皇求孟英診焉脈大而數重按虛散與東洋參熟地黃辰砂磁石龍齒菖蒲棗仁琥珀肉桂金箔龍眼肉爲劑投匕即安翼日能課徒矣

金祿卿室沈裕昆之女也患温顧聽泉連進輕清凉解而病不減氣逆無寐咳吐黏痰舌絳咽乾耳聾讝語旬日外始逆孟英診焉曰體瘦脈細數尺中更亂竟是陰氣先傷陽氣獨發所謂傷寒偏死下虛人譬之火患將臨既無池井缸貯又空縱竭心力曷能有濟再四研詰乃知發熱前一日陡然帶下如崩是眞液早經漏泄矣否則藥治未譌胡反燎原益熾痙厥之變不須旋踵祿卿堅懇勉圖孟英以西洋參生地二冬二至元參犀角黃連鷄子黃知母爲方另用石斛龜板鼈甲各四兩左牡蠣一斤煮湯代水煎藥顧聽泉又加阿膠且云我儕用此育陰鎭陽

充液息風大劑焉能津枯風動痙厥陡生乎服兩劑果不能減後惑旁言而禱籤藥附桂乾薑罔知顧忌徑至四肢拘攣而逝是誤藥速其斃而增其慘也繼而裕昆患溼溫亦犯重暍而亡

一嫗患右腰痛脹欲捶多藥不效孟英視其形雖羸瘦而脈滑痰多苔黃舌絳曰體虛病實溫補非宜苟不攻去其疾徒以疲藥因循則病益實體益虛糜帑勞師養成寇患豈治病之道哉先以雪羹加竹茹楝實綠萼梅杏仁花粉橘紅茯苓旋覆花送控涎丹服後果下膠痰三進而病若失嗣與調補獲痊

楊氏婦孀居患瀉久治不瘥孟英曰風木行胃也彼不之信另

溫病忌誤汗不忌誤下以汗則津涸而熱益熾下則熱勢可藉以少減也

招張某大進溫補乃致腹脹不食夜熱不眠吐酸經秘頭疼如劈復乞孟英視之先投苦泄佐辛通以治其藥嗣以酸苦息風安胃匝月乃瘳續與調補汛至而康

魏緫谷浼孟英視其郁甥之病熱踰半月自胸次脹及少腹痛而不可撫摩便秘溺赤舌黑口乾自汗煩躁六脈弦強無胃曰此恙酷似傷寒大結胸證結胸煩躁無藥可治越二日便行而歿孟英曰傷寒之邪在表誤下則邪陷而成結胸未經誤下不爲結胸溫熱之邪在裏逆傳於心包而誤汗則內閉以外脫順傳於胃府而誤汗則盤踞而結胸前人但云誤汗刼奪胃汁而

未及於結胸者因結胸證不多見耳然亦不可不知也故謹識之郁病初起某醫用葛根一劑繼則胡某之柴葛羌防十餘劑釀成是證

施氏婦產後四肢串痛藥治罔效醫謂其成癱瘓矣延已踰月丐孟英視之膏藥徧貼呻吟不息脈數而洪舌絳大渴曰此非風溼爲病膏藥亟爲揭去近日服藥諒皆溫補祛風之劑營血耗傷內風欲動勢將弄假成眞且吾向見其體豐血旺何以娩後遽患斯疾必生化湯砂糖酒之類所釀耳其父倪某目雖瞽聞而笑云君誠天醫也小女服過生化湯二帖赤沙糖八斤從

此漸病不識尚可起廢圖全否孟英曰幸其體足於陰恢復尚易若陰虛血少之人而蹈此轍雖不卽死難免不成蓐損因投大劑凉潤壯水之藥一劑知旬日安匝月起

王士乾室素多鬱怒氣聚於腹上攻脘痛旋發旋安花甲外病益甚醫治益劇李西園薦孟英視之曰此非人間之藥所能療矣辭不與方其夫子及壻環乞手援孟英曰旣爾吾當盡力以冀延可也然腹中聚氣爲瘕攻痛嘔吐原屬於肝第病已三十（用古方不可不知此意）載從前服藥諒不外乎溫補一途如近服逍遙散最刼肝陰理中湯極傷胃液名雖療疾實則助桀人但知嘔吐爲寒而未識

風陽內煽水自沸騰專於爐內添薪津液漸形涸竭奈醫者猶云水已不吐病似漸輕是不察其水已吐盡僅能些迎空嘔所以不能納穀便祕不行脈絃無胃舌痿難伸蘊隆蟲蟲何所措手可謂女人亦有孤陽之病矣勉以西洋參肉蓯蓉麥冬蕤生白芍石斛竹茹柏子霜紫石英爲方豬肉煮湯煎藥和入青蔗漿人乳服後嘔噦皆止人以爲轉機孟英曰譬草木乾枯已久驟加灌漑枝葉似轉青葱奈根荄槁矣生氣不存亦何益耶繼而糜粥漸進頗思肉味其家更喜以爲有望孟英曰且看解後何如越數日大便頗暢殊若相安亟迓復診孟英曰枉費苦

（害病者宜讀此二語）

心矣脈不柔和舌不潤澤雖穀進便行而生津化液之源已絕藥石焉能於無中生有哉夏至後果殞

五月下旬天卽酷熱異常道路受暑而卒死者甚多卽古所謂中暍也而不出戶庭之人亦有是病延醫不及醫亦不識此證雖死身不遽冷且有口鼻流血者孟英曰是暑從吸入直犯心藏也惟新產婦人陰血大去熱邪易襲故死者尤多柰愚者不知因時制宜尙扃其牕戶寡以帟幃環侍多人皆能致病又粗工不察天時人秉之不齊動輒生化湯以致覆杯而斃者比比卽砂糖酒亦能殺人不可不愼孟英曰六一散旣淸暑熱又行

瘀血。當此酷暑之令。誠爲產後第一妙方。特爲拈出。幸救將來。

孟英曰。吾聞姚氏婦妊已臨月。腹中作痛。家人謂其將娩。急煎參湯令服。服後痛益甚。忙喚穩婆至。已渾身赤斑。喘逆昏狂。雖知受暑。竟不及救。又曹氏婦亦懷妊臨月。腹痛。家人疑其欲產而煎參湯。迨湯成痛已止。察其情景。知不卽娩。然炎威甚烈。參湯久存。欲壞。其姑云。婦旣未娩。豈可服參。滯胎。我體素虛。常服補劑。參湯定亦相宜。遂服之。甫下嚥。卽覺氣悶躁擾。霎時危殆。多方拯治。踰刻而終。予按富貴人之死於溫補者。固爲常事。當酷暑之令。漫不少懲。誠下愚之不可移矣。附錄於此。以冀司命

之士鑑而戒之

酷熱之際瘧疾甚行有儲麗波患此陸某泥今歲寒水司天溼土在泉中運又從溼化是以多瘧率投平胃理中之法漸至危殆伊表兄徐和圃薦孟英視之熱熾神昏胸高氣逆苔若薑黃溺如赭赤脈伏口渴不食不便曰舍現病之暑熱拘司氣而論治謂之執死書以困活人幸其體豐陰足尙可救藥然非白虎湯十劑不能愈也和圃然之遂以生石膏知母銀花枳貝黃連木通花粉茹芩杏斛海蛇竹葉等相迭爲方服旬日瘧果斷

外甥莊迪卿患瘧大渴而喜熱飲脘悶脈伏苔膩欲嘔孟英曰

論證論治俱極明透

蘊溼內盛暑熱外侵法當清解然脈證如是乃痰阻氣道使然清之無益溫之助桀宜以礞石滾痰丸先爲開導服後痰出甚多脈卽見絃滑而數嘔止胸舒苔形黃燥與石膏知母連朴杏橘半茯滑斛菖蒲花粉等藥而安

莊曉村芝階姊夫之姪孫也館於金愿谷舍人家病瘧孟英曰吸受暑熱淸滌卽瘳閱數日瘧作甚劇目赤狂言汗如雨下居停大驚聞服涼劑疑爲藥誤亟速孟英至正在披狂莫制之時按其脈洪滑無倫視其舌深黃厚燥心疑其另服他藥之故而撲鼻吹來一陣薑棗氣因詰曰得無服薑棗湯乎曰恣飲三日

解暑妙品

矣孟英即令取西瓜一枚劈開任病者食之方從白虎而生石膏用一兩六錢病即霍然踰六年以他疾亡繼有陳仰山如君患瘧孟英連與清暑法病不少減孟英疑亦薑棗湯所致詢知果然亟令屏絕遂愈餘如汪子寬魏雲裳胡秋紉等暑瘧治案皆以白虎化裁案多不備載錄此以待讀者之隅反焉

陳某自黔來浙一小兒發熱肢搐幼科與驚風藥遂神昏氣促汗出無溺適孟英至而視之曰暑也令取蕉葉鋪於泥地與兒臥之投以辰砂六一散加石膏知母西洋參竹葉荷花露一劑而瘳繼有胡氏女病略同兒科云不治因懇於孟英亦以此法

認證既確治法又極精妙眞可爲萬世法程

活之。

潘紅茶方伯之孫翼廷館於許雙南家酷熱之時啜冷石花一椀遂致心下痞悶四肢漸冷而上過肘膝脈伏自汗方某診謂陽虛陰暑脫陷在卽疏大劑薑附丁桂以回陽雙南在蘇其三郎杏書駭難主藥邀族人許芷卿診而決之芷卿云此藥斷不可投第證極危急須逆孟英商之時夜已半孟英往視曰既受暑熱復爲冷飲冰伏胸中大氣不能轉旋是以肢冷脈伏二便不行速取六一散一兩以淡鹽湯攪之澄去滓調下紫雪丹一（藉辛香以通冰伏之氣用藥精妙）錢翼日再診脈見胸舒溺行肢熱口乾舌絳暑象畢呈化而爲

此溫證之輕者用藥合法故其愈甚

瘧與多劑白虎湯而愈丙午舉於鄉

金曉耕發熱二旬醫與表散竟無汗泄嗣投溫補而大解泄瀉小水不行口乾肌削勢瀕於危胡秋紉薦孟英診之右寸獨見沉數曰暑熱錮於肺經耳與白虎葦莖天水加芩桔杏貝爲方服後頭面痦瘮徧發密無鍼縫明如水晶光人皆危之孟英曰此肺邪得泄也果膚潤熱退瀉止知饑又服甘涼濡潤二十餘劑痦瘮始愈亦僅見之證也

何永昌者孟英之輿人也其妻病瘧間二日而作乃母曰瘧不可服官料藥徑服籤方旬日後勢甚危永昌乞孟英救之脈沉

暑邪入腎必傷腎液故重用滋陰之品以救之

細而數尺爲甚口渴目不欲張兩腰收痛宛如錐刺寒少熱多心慌不能把握曰異哉病也此暑入足少陰之證喻氏所謂汗下温三法皆不可行者若病在別家慮其未必我信病在汝而求診於我事非偶然也汝母云官料藥不可治瘧此語出於何書而藥別官私何人所創既官料之勿服則私料更不可妄試矣殊屬可嗤然是證若延醫診非表散卽温補不可謂非汝母之一得也疏方元參八錢龜板石斛各一兩地骨皮六錢知母五錢桑葉金銀花各四錢花粉三錢丹皮二錢令用大砂鍋煎而頻服不必限劑服三日瘧斷而各恙皆減粥食漸進不勞餘

藥而起。

愼氏婦產後腹脹泄瀉面浮足腫醫與滲溼溫補月餘不效疑爲蓐損孟英視之舌色如常小溲通暢宛似氣虛之證惟脈至梗澀毫無微弱之形因與丹參滑石澤蘭茯苓茺蔚蛤殼桃仁（亦行瘀利水之法）海蛇五靈脂豆卷數服卽瘥。

孫某患感醫投溫散竟無汗泄延至十一日始請孟英視之業已神昏囊縮面赤舌絳目不識人口不出聲胸膈微斑便瀉而小溲不行者已三日醫皆束手或議大投溫補以冀轉機孟英（溫病已至神昏而議溫補眞盲論也）急止之曰陰分素虧而溫散刼津邪熱愈熾則營衛不行豈可

妄云漏底欲以温燥竭其欲絕之陰乎。婁浦上林先生治予先君之病云泄瀉爲熱邪之出路求之不可得者胡可止也以西洋參生地麥冬丹皮連翹生芍石菖蒲鹽水炒黃連甘草梢百合茯苓貝母銀花紫菀爲方一劑卽周身徵汗而斑退三劑始得小溲一杯而識人四劑乃得大汗而身熱退面赤去莖亦舒復解小溲二杯次日於方中減連翹菖蒲丹皮黃連加知母蔵甤竹葉投之舌始潤神始淸知渴索水孟英令將蔗梨等榨汁頻灌不歇其汗如雨下者三晝夜始休於是粥漸進瀉漸止溲漸長前方又去貝母銀花紫菀加石斛龍眼肉服之全愈

汪子與病革始延孟英視之曰陰虛之質暑熱膠錮殆誤投補藥矣乃叔少洪云姪素孱弱醫投熟地等藥十餘劑耳孟英曰暑熱證必看邪到血分始可議用生地何初病即進熟地豈僅知稟賦之虛未睹外來之疾耶昔賢治暑但申表散溫補之戒詎料今人於律外更犯滋膩之辜而一誤至此略無悔悟不啻如油入麵如漆投膠將何法以挽回哉越日果卒夫小米舍人僅此一脈完姻未久遽爾珠沉殊爲慘然多閒吳忻山亦惟一子素稟虛怯滋補頻投醫者不察其患溫發熱僉謂陰虛競投膩滯培元之劑乃至舌黑卷短唇焦溺赤孟英一診即云不救

顧聽泉竭力圖維。終不能愈。按虛人受感。每蹈此轍。特錄以為戒。

汪左泉病滯下。晝夜數十行。而即日須補歲考遺才。浼孟英商速愈之策。切脉絃滑。苔黃滿布。曰易事耳。重用芩連佐以査朴。送服青麟丸四錢。投七而痊。略無他恙。

陳晝三病滯下。某進通因通用法。痛泄無度。嘔惡不納。汗出息微。脈弱眩暈。孟英曰。近多伏暑之痢。此獨非其證也。元將脫矣。急投大劑温補。脈候漸安。一月後甫得健復。

金朗然之母。偶發脘疼嘔吐。醫與温補藥。初若相安。漸至畏寒

汪子與證誤服熱地而不救此證誤服温補兼熱地而竟愈蓋證有虛實治有遲早邪有重輕未可以一端拘也

不痳四肢不仁更醫云是風痺仍投温補因而不饑不食二便不行肌肉盡削帶下如溺始延孟英診之曰暑伏肺胃耳其多投温補而不遽變者以熟地等陰柔膩滯為之挾制也然津氣灼爍而殆盡脂液奔迫以妄行治節無權陽明涸竭焉能衞皮毛而暢四肢利機關以和九竅哉與白虎湯加西洋參竹茹橘皮絲瓜絡石斛花粉竹瀝海蛇蓮進二十劑始解黑矢而各恙漸安嗣與和肝胃調八脈以善後遂愈李某向患脘痛孟英頻與建中法獲瘳今秋病偶發他醫診之聞其温補相投徑依樣而葫蘆服後耳閉腿疼不饑便滯仍就孟英視之曰暑邪內

伏誤投補藥使然治宜清滌爲先彼不之信反疑爲風氣付外科灼灸遂致筋不能伸而成錮疾孟英曰此證較金病輕踰十倍惜其惑於淺見致成終身之患良可歎也獨怪謀利之徒假河間太乙鍼之名而妄施毒手舉國若狂竟有不惜重價求其一鍼隨以命殉之者吾目擊不少矣夫內經治病原有熨之一法然但可以療寒溼凝滯之證河間原方惟二活黃連加麝香乳香耳主治風痺今乃託諸鬼神矜誇祕授云可治盡內傷外感四時十二經一切之病天下有是理乎況其所用之藥羣集辛熱香竄之品點之以火顯必傷陰一熨而吐血者有之其不

可輕試於陰虛之體與挾熱之證也概可見矣吾友盛少雲之尊人臥雲先生誤於此而致周身潰爛臥牀數載以亡仲聖焦骨傷筋之訓言猶在耳操醫術者胡忍執炮烙之嚴刑欺世俗而罔利哉

喬有南之姪甫五齡發熱數日兒醫與柴葛解肌湯一劑肢搐而厥目張不語其母孀居僅此一脈徧求治療毫無寸效所親徐和甫託王瘦石訪一擅幼科之長者瘦石謂宜求善於外感者蓋人有大小病無二致切勿舍大方而信專科此喻嘉言活幼金鍼也盍延孟英視之徐從之孟英曰病是暑邪治以風藥

清暑熱熄肝風
方極平允

熱得風而焰烈津受爍以風騰乃風藥引起肝風再投俗尚驚風之劑稱子根本不牢而狂風不息折拔堪虞與王氏犀角地黃湯加羚羊角生石膏元參桑葉菊花銀花牡蠣知母麥冬竹葉諸藥數服而痊

趙鐵珊乃郎子善康康侯之壻也因事抑鬱凍寒發熱湯其作血虛治進以歸芎丹參之類多劑不效乃移榻康寓延孟英診之脈濇而兼沈紘以數熱舌無苔口不渴便溺如常納穀稍減惟左脇下及少腹自覺梗塞不舒按之亦無形迹時欲撫摩似乎稍適曰陰虛挾鬱暑邪內伏夫鬱則氣機不宣伏邪無從走

此證不遇孟英必成虛損訖無知其爲伏暑者誰死亦不知前人之誤也

泄遽投血藥引之深入血爲邪踞更不流行腸腹不舒乃其眞諦第病雖在血而治宜清氣爲先氣得宣布熱象必露瘀滯得行厥疾始瘳子善因目擊去年婦翁之恙頗極欽服連投清氣熱果漸壯譫妄不眠口乾痰嗽孟英曰脈已轉爲弦滑瘀血伏邪皆有欲出之機繼此當用凉血清瘀爲治但恐旁觀詫異事反掣肘囑邀顧聽泉質之顧亦云然遂同定犀角地黃湯加味而所親陳眉生許小琴暨乃兄子勉皆疑藥凉劑重雖是熱證豈無冰伏之虞顧爲之再四開導總不領解適病者鼻衄大流孟英笑曰眞贓獲矣諸公之疑可否冰釋渠舅氏陳穀人鹺尹

云證有疑似原難主藥鼻血如是病情已露毋庸再議徑煎而飲之次日衄復至苔色轉黑孟英曰三日不大便瘀熱未能下行也於前方加滑石桃仁木通海蛇竹瀝石斛銀花知母花粉之類又二劑大解始行黑如膠漆三日間共下七十餘次而止乃去木通桃仁輩加西洋參麥冬以生液病者疲憊已極沈寐三晝夜人皆危之孟英曰聽之使其陰氣之來復最是好機醒後尚有微熱讝語藥仍前法又旬日始解一次黑燥大便而各恙悉退惟口尚渴與大劑甘涼以濡之又旬日大解甫得復行色始不黑乃用滋陰塡補而康

一圃人詣孟英泣請救命詰其所以云家住清泰門內馬婆巷因本年二月十五日卯刻雷從地奮火藥局適當其衝墻垣屏宇一震泯然雖不傷人而附近民房撼搖如簸其時妻在睡中驚醒卽覺氣不舒暢半載以來漸至食減形消神疲汛少惟臥則其病如失藥治罔效或疑邪祟所憑祈禳厭鎮亦屬無靈敢乞手援幸無卻焉孟英許之往見婦臥於榻神色言動固若無恙診畢病人云君欲覩我之疾也坐而起果卽面赤如火氣息如奔似不能接續者苟登圊溲便必賁逆欲死前所服藥破氣行血和肝補肺運脾納腎清火安神諸法具備輒如水投石孟

仍是治肝之法

英仿喻氏治厥癲疾之法用藥一劑知旬餘愈

高若舟之庶母年踰花甲體豐善瀉張某向用參朮取効今秋患白痢張謂寒溼滯中仍與理中加減病遂日增因疑老年火衰蒸變無權前藥中復加附子白痢果減而腹脹且疼不食不溺噦逆發熱勢已危殆始延孟英視之脈沈而滑數梗梗曰暑熱未清得無補藥早投乎與芩連杏朴麴芍滑楝銀花海蛇雞內金之類一劑溺行痛減而痢下仍白其女爲屠西園之室乃云向服補藥白痢已止今服凉藥白痢復作蓋病本久寒凉藥不可再用矣孟英曰言頗近理使他醫聞之必改溫補但病機

通達之論醫所宜知

隱伏測識匪易前此之止非邪淨而止之止乃邪得補而不行之止邪氣止而不行是以痛脹欲死夫强止其痢遽截其瘧猶之乎新產後妄濇其惡露也世人但知惡露之宜通而不知間有不可妄通者但知瘧痢之當止而不知邪未去而强止之其害較不止爲尤甚也今邪未清滌而以温補藥壅塞其流行之道以致邪不能出逆而上衝噦不能食是痢證之所畏吾以通降凉潤之劑攪邪埽濁惟恐其去之不速胡反以白痢復作爲憂豈欲留此垢滯於腹中冀其化脂膏而填空隙故若是之寶惜而不願其去耶幸若舟深信竟從孟英議尋愈

十八淵徐有堂室病痢醫作寒溼治廣服溫補之藥痢出覺冷遂謂沈寒改投燥熱半月後發熱無溺口渴不饑腹疼且脹噦痛不眠翁嘉順囑其求診於孟英察脈絃細沈取甚數舌絳無津肌肉盡削是暑熱膠錮陰氣受爍與北沙參肉蓯蓉芩斛楝芍銀花桑葉丹皮阿膠合白頭翁湯爲劑夾日各患皆減痢出反熱有堂不解問故孟英曰熱證誤投熱藥熱結而大便不行者有之或熱勢奔迫而泄瀉如火者有之若誤服熱藥而痢出反冷者殊不多見也無怪醫者指爲久伏之沈寒吾以脈證參之顯爲暑熱然暑熱之邪本無形質其爲滯下也必挾身中有

形之垢濁故治之之道最忌補澁壅滯之品設誤用之則邪得補而愈熾濁被壅而愈塞耗其眞液之灌漑阻其正氣之流行液耗則出艱氣阻則覺冷大凡有形之邪皆能阻氣機之周流如痰盛於中胸頭覺冷積滯於府臍下欲熨之類皆非眞冷人不易識吾曾治愈多人矣徐極歎服仍議育陰滌熱病果漸瘳蕭某素患痰多常服六君子湯偶延孟英診之脈細數而兼絃滑曰六君亟當屏絕病由陰虧火盛津液受灼而成痰須服壯水之劑庶可杜患將來蕭因向吸鴉片煙自疑虛寒滋陰不敢頻服繼患咽痛專科治而不效仍乞診於孟英因謂曰早從吾

策溪至是耶此陰虛於下陽浮於上喉科藥不可試也大劑育陰潛陽其痛日瘥而喉腭皆形白腐孟英曰吸煙既久毒氣薰蒸之故耳令吹錫類散始得漸退愈後復患滯下孟英曰今秋痢雖盛行而此獨異於人切勿以痢藥治之蓋火迫津液結爲痰飲釀以煙毒薰成喉患吾以燃犀之照而投激濁揚清之治病雖愈矣內蘊之痰濁尚多奈向來爲溫補藥所禁錮於腸胃曲折之間而不得出今廣投壯水之劑不啻決江河而滌陳莝豈可與時行暑熱之痢同年而語耶治不易法食不減餐日數十行精神反加踰月之後大解始正計服甘涼約二百劑肌肉

復充痰患若失。

孫位申患感證見耳聾醫者泥於少陽小柴胡之例聾益甚孟英視之曰伏暑也與傷寒治法何涉改投清肺之藥聾減病安將進善後法矣忽一日耳復聾孟英診之莫測其故因詰其食物云昨日曾喫藕粉一碗孟英曰是矣肆間藕粉罕眞每以他粉攙混此必葛粉耳不啻誤服小柴胡一劑復投肅清肺胃藥尋愈錄此以見其審證周詳所謂無微不入也

顧宗武偶患微寒發熱醫進溫散法熱雖退而不饑不大便復用平胃散數帖腹漸脹而偏於右尙疑其中氣之虛寒也遂與

雜藥亂投一何可笑

溫運燥補諸藥服乃日增杳不進穀或謂恐屬癰瘍因招外科連某診之作腸瘕治病如故黃某作腸癰論以大黃瀉之亦不應嚴某謂脇疽部位不對腸癰證據不符作內疝治仿子和活人之法及當歸龍薈丸相間而投亦無效乃延孟英視之脈極絃細而促舌絳大渴小溲赤少飲而不食者月餘矣證實脈虛堅辭不治其家問曰此證究是何病乞為指示孟英曰據述病人素慎起居而薄滋味顯非停滯與癰疽之患良由暑溼內藴勢欲外泄是以初起有微寒發熱之候誤與風寒藥熱雖暫退於表邪仍伏處乎中不饑不便肺胃失其下行再加辛燥溫補

氣機更形窒滯。伏邪永無出路。津液潛消。䐜脹日甚。以氣血流行之藏府。為暑溼割據之窠巢。補之不可。攻之不能。病雖不在膏肓。盧扁望而驚走。踰旬徑歿。

黃蓮泉家戚嫗病痢。朱某以其年老。而為舍病顧虛之治。漸至少腹結塊。攻痛異常。大渴無溺。杳不知饑。晝夜百餘行。五色並見。呼號欲絕。始延孟英診之。脈至沈滑而數。因謂曰。縱使暑熱深受。見證奚至是耶。此必溫補所釀耳。夫痢疾古稱滯下。明指欲下而澀滯不通也。顧名思義。豈可以守補之品。更滯其氣。燥烈之藥。再助其虐乎。少腹聚氣如瘕。痢證初起。因於停滯者有

痢疾初起卽補變成噤口者有之延爲休息者有之邪因補而固結不解雖有明手無如之何良可歎恨

之今見於七八日之後時欲衝逆拔之不轉則顯非停滯之可擬實爲藥劑之誤投以致邪濁蟠踞滋蔓難圖及檢所服諸方果是參朮薑萸附桂粟殼故紙川椒烏梅等一派與病刺謬之藥孟英曰彼豈讎於汝哉畏老而補之見痢而止之亦未嘗不煞費苦心而欲汝病之卽愈惜徒有欲愈之心未明致愈之道但知年老元虛不聞邪盛則實彼亦年近古稀懸壺多識竟畢世沈迷於立齋景岳諸書良可歎也豈造化果假權於若輩乎不然何彼書彼術之風行哉戚云壬寅之病賴君再生今乃一誤至此恐仙丹不能救矣孟英曰幸未喔噦尚可希冀一二遂

與蓯蓉楝芍芩連橘斛查麴元胡綠梅鼈甲鷄金鼠矢海蛇出入互用數帖漸安繼加駐車丸吞服踰月始健

周某患瘧間二日而作寒少熱多醫謂老年三瘧放手温補漸至杳不進穀所親李石泉孝廉囑迎孟英診之脈細硬如弦毫無胃氣右尺洪數舌色光絳大渴溺濇曰此足少陰暑瘧也廣服温補津液盡刼欲以草木生之事不及矣世但知治瘧不善有三患邪留肝絡則爲瘧母戕及脾元則爲瘧鼓耗乎腎陰則爲瘧勞而此證以藥助邪邪將劫命求轉三患亦不能得所謂熱得補而更熾陰受爍以速亡陰愈亡則邪愈熾何殊炮烙之

刑病者何辜可慘可慘踰日果歿特錄以爲戒醫者鑒之

一老廣文俸滿來省驗看患眩暈醫謂上虛進以參耆等藥因而不食不便煩躁氣逆孟英診曰下虛之證誤補其上氣分實而不降先當治藥然後療病與巵豉芩桔枳橘菀貝一劑粥進便行繼用滋陰息風法而愈

上廣陳茂才患頭痛三日一發發則惡寒多藥不效飲食漸減或擬大劑薑附或議須投金石葛仲信囑其質於孟英察脈甚弦重按則滑曰熱暑伏厥陰也溫補皆爲戈戟與左金加楝芍巵桑羚丹菊橘爲劑兼吞當歸龍薈丸三服而減旬日即痊

因前醫之誤而始思轉計已非良醫所爲況明將溫燥表散之害而仍蹈覆轍焉足云醫

關穎庵患寒熱醫者泥於今歲之司天在泉率投溫燥以致壯熱不休阮某用小柴胡和解之治遂自汗神昏苔黑舌強肢掣不語脣繭齒焦張某謂斑疹不達擬進角刺荆蒡越醫指爲格陽假熱欲以附子引火歸原許芷卿知爲伏暑而病家疑便溏不可服涼藥復逆孟英診之曰陰虛之體熱邪失清最易劫液幸得溏泄邪氣尚有出路正宜乘此一綫生機迎而導之切勿遲疑遂與芷卿商投晉三犀角地黃湯加知麥花粉西洋參元參貝斛之類大劑服八九日甫得轉機續與甘涼充液六七劑忽大汗如雨者一夜人皆疑其虛脫孟英曰此陰氣復而邪氣

解也切勿驚惶嗣後果漸安㪅投以滋補而愈繼有陳菊人明府乃郎病較輕於此因畏犀角不敢服竟致不救豈不惜哉

余某年三十餘發熱數日醫投凉解之法遂嘔吐自汗肢冷神疲亟延孟英診之脈微弱曰內傷也豈可視同伏暑而一概治之徑不詳辨其證耶與黃耆建中去飴加龍骨生薑茯苓橘皮投劑卽安續加參术逾旬而愈

錢氏婦懷妊四月而患寒熱如瘧醫與發散安胎乃至舌黑神昏大渴便泄臭痰頻吐腰腹痛墜人皆不能措手孟英診曰伏暑失於清解舌雖黑而脈形滑數痰雖臭而氣息調和是胎尚

未壞猶可治也重用氣血兩淸之藥五劑而安糜粥漸進腰腹皆舒胎亦躍躍

方氏女久患泄瀉脘痛間兼齒痛汛事不調極其畏熱治不能愈上年初夏所親崔映溪爲延孟英診之體豐脈不甚顯而隱隱然弦且滑焉曰此肝强痰盛耳然病根深錮不可再行妄補渠母云溏泄十餘年本元虛極廣服培補尙無寸效再攻其病豈不可虞孟英曰非然也今之醫者每以漫無著落之虛字括盡天下一切之病動手輒補舉國如狂目擊心傷可勝浩歎且所謂虛者不外乎陰與陽也今肌肉不瘦冬不知寒是陰虛乎

凡病皆宜如此不獨痰飲爲然

抑陽虛乎祗因久瀉遂不察其脈證而僉疑爲虛寒之病矣須知痰之爲病最頑且幻益以風陽性尤善變治必先去其病而後補其虛不爲晚也否則養癰爲患不但徒費參藥耳毋不之信徧訪醫療千方一律無非補藥至今秋頸下起一痰核黃某敷之使平更以大劑溫補連投百日忽吐瀉膠痰斗許而亡予按此痰飲滋蔓木土相讎久則我不敵彼而潰敗決裂設早從孟英之言斷不遽死於今日也

康康侯司馬之夫人泄瀉頻年納食甚少稍投燥烈咽喉即疼治經多手不能獲效孟英診曰脾虛飲滯肝盛風生之候也用

健脾滌飲平肝熄風入絡參术橘半桂苓楝芍木瓜蒺藜投之漸愈今冬又患眩暈頭汗面熱肢冷心頭似絞呻吟欲絕孟英以石英蓯蓉牡蠣綠蕚梅仍是柔肝滌飲之法苓蒺楝芍旋覆爲方竟劑即康

盛墨莊冬患間瘧因腹脹畏寒自服神麴薑湯勢益甚延孟英視之曰暑溼內伏也以黃連枳樸梔芩杏貝知斛旋橘蘭草等清暑滌濕兩解餘熱之聖藥妙方也爲劑蘆菔煮湯煎藥三啜而瘥

鮑繼仲患瘧每發於冬醫作虛寒治更劇孟英診之脈滑苔厚溺赤痰濃與知母花粉冬瓜子杏貝茯苓滑石梔子石斛而安

孫渭川令姪亦患此氣逆欲死孟英視之口渴頭汗二便不行

此證乃熱痰伏於肺絡也至冬則熱爲寒束故應時而發古人治法於未寒時先以滾痰丸下之使冬時無恙可束則愈但其法太峻人多不敢用今孟英以輕清通透之品搜絡中之伏痰斯有利而無弊與可補古人所未及

徑與生石膏橘貝桂苓知母花粉杏菀海蛇等藥而愈一耳姓回婦病痚自以爲寒頻飲燒酒不但病加更兼嘔吐泄瀉兩腳筋掣既不能臥又不能坐孟英診曰口苦而渴乎瀉出如火乎小溲不行乎痰黏且韌乎病者云誠如君言想受寒太重使然孟英曰汝何愚耶見證如是猶謂受寒設遇他醫必然承教況當此小寒之候而痚喘與霍亂世俗無不硬指爲寒者誤投薑附汝命休矣與北沙參生薏苡冬瓜子絲瓜絡竹茹石斛枇杷葉貝母知母梔子蘆根橄欖海蛇蘆菔汁爲方一劑知二劑已

吳芸閣因壯年時患徽瘡過服寒涼之藥瘡雖愈陽氣傷殘虛

寒病起改投溫補如金液丹大造丸之類始得獲安奈醫者昧於藥爲補偏救弊而設漫無節制率以爲常馴致血溢於上便泄於下食少痰多喘逆礙臥兩足不能屈伸童某猶云寒溼爲患進以苓薑朮桂湯多劑勢益劇且溲漸少而色綠如膽汁醫皆不能明其故延孟英診之脈弦軟無情曰從前寒藥戕陽今則熱藥竭陰矣胃中津液皆灼爍以爲痰五藏咸失所養而見證如上水源欲絕小溲自然漸少木火內焚乃露東方之色與章虛谷所治暑結厥陰用來復丹攻其邪從溺出而見深碧之色者彼實此虛判分天壤恐和緩再來亦難爲力矣尋果歿

卽熱入血室亦豈不可治之證可見此人并不知熱入血室爲何病竊妄指其名耳

戴氏婦年五十六歲仲冬患感初服楊某歸柴丹參藥一劑繼服朱某乾薑蒼朮厚朴藥五劑遂崩血一陣謂其熱入血室不可治矣始延孟英診之脈形空軟促數苔黑舌絳足冷而強息微善笑詢其汛斷踰十載曰冬溫失於清解營血暴脫於下豈可與熱入血室同年而語耶必由誤服熱藥所致因檢所服各方而歎曰小柴胡湯與冬溫何涉卽以傷寒論亦不能初感卽投況以丹參代人參尤爲悖謬夫人參補氣丹參行血主治天淵不論風寒暑溼各氣初感皆禁用血藥爲其早用反致引邪深入也既引而入再誤於辛熱燥烈之數投焉得不將其僅存

此人肺氣素不清藴又兼陰虚挾飲故感受溫

無幾之血逼迫而使之盡脫於下乎女人以血爲主天癸既絕無病者尚不宜有所漏泄况温邪方熾而陰從下脫可不畏哉病家再四求治孟英與西洋參蓯蓉生地犀角石斛生芍銀花知母麥冬甘草蔗漿童溺兩劑足温舌潤得解醬糞脈數漸減而咳益甚乃去犀角加高麗參數帖脈漸和熱退進粥隨以調補幸得向安

王開榮素患痰嗽兼有紅證今冬病頭疼發熱渴飲不饑便溏溺少譫語神昏自述胸中冷氣上衝醫見其面赤痰喘欲投附桂黑錫丹等藥所親翁嘉順囑勿輕服爲延孟英診之脈滑且

邪彌見轇轕非此始終如法施治殊難奏效也

數日溫邪挾宿飲上逆法當清解與北沙參冬瓜子知母滑石花粉石菖蒲貝母杏仁蘆根葱白淡豉竹瀝兩劑後面赤退乃去葱豉加麥冬桑葉枇杷葉數帖熱去瀉減譫語止頭痛息喘定神清乃裁菖滑加梨汁地栗海蛇服數日痰漸少穀漸安渴止溺行始進養陰之法遂以霍然

石子章患腹脹朱某與大劑溫補之藥殊若相安孟英見而非之彼云服之略不助脹正須多服圖痊君何疑焉孟英曰形瘦脈數舌色乾紅此爲陰虛熱脹昔年范次侯室暨楊改之如君之恙皆類此醫咸攻補徧施病無小效吾以極苦泄熱微辛通

絡之法投之應手而瘳今子病初起時脹不礙食證非氣分可知而溫補不助脹遂服之不疑不知陰愈耗絡愈痺脹雖不加而肌愈削脈愈數乾嗆氣急與女子之風消息賁何以異耶尋果不起予按喻氏始言男子亦有血蠱證可見男女雖別而異中有同同中有異臨證者不可膠柱以鼓瑟也

沈某患脘痛嘔吐二便祕濇諸治不效請孟英視之脈弦耎苔黃膩曰此飲證也豈沈湎於酒乎沈云素不飲酒性嗜茶耳然恐茶寒致病向以武彝紅葉熬濃而飲諒無害焉孟英曰茶雖凉而味清氣降性不停留惟蒸遏爲紅味變甘濁全失肅清之

此上有停飲下元虛寒故用藥如此

腸癰無溫補內托之法

清其上源而下

氣遂爲釀痰之媒較彼麴蘗殆一間耳醫者不察僅知嘔吐爲寒萸薑黄洗附不特與病相反抑且更煽風陽飲藉風騰但升不降是以上不能納下不得通宛似關格然非陰枯陽結之候以連楝梔芩旋復竹茹枇杷葉橘半苓澤蛤殼荷莖生薑衣爲方送服震靈丹數劑而平匝月而起

石芷卿驟患腹脹旬日後臍間出膿（濕熱積於小腸）外科視爲腸癰與溫補內托之藥遂咳嗽不眠腹中絞痛異常痰色紅綠大便不行乃延孟英商之脈甚細以數舌絳而大渴曰察脈候是眞陰大虛之（乃眞陰爲熱藥所爍非本如是也）證耆朮歸桂皆爲禁劑以甘露飲加西洋參花粉貝母杏仁冬

流自清亦喻氏法也

瓜子投之痰咳卽安外科謂此恙最忌泄瀉潤藥不宜多服（此何恙也而以爲最忌泄瀉真囈語也）孟英曰陰虛液燥津不易生雖求其瀉不可得也惡可拘泥一偏而不知通變哉仍以前法去杏貝花粉加知母百合合歡爲方并囑其另邀老醫朱嵩年敷治其外如法施之果漸向安久之當臍痂落如小兒蛻臍帶狀臍內新肉瑩然而愈

袁某患噫聲聞於鄰俞某與理中湯暨旋覆代赭湯皆不效孟英診之尺中虛大乃詰之曰爾覺氣自少腹上衝乎病者云誠然孟英曰此病在下焦用胡桃肉故紙韭子菟絲小茴鹿角霜枸杞當歸茯苓覆盆龍齒牡蠣服一劑其衝氣卽至喉而止不

作聲爲噫矣再劑寂然多服竟愈

沈耆暘之毋偶患咽喉微痛服輕淸藥一劑卽覺稍安且起居作勞如常第五日猶操鍼黹至四鼓第六日忽云坐立不支甫就榻卽昏沈如寐亟延王瘦石視之用犀角地黃湯化萬氏牛黃丸灌之繼邀徐小坡亦主是湯云恐無濟乃邀孟英決之切其脈左數右滑皆極虛爽曰王徐所見極是但雖感冬溫邪尙輕微因積勞久虛之體肝陽內動爍液成痰逆升而厥儼似溫邪內陷之候方中犀角靖內風牛黃化痰熱不妨借用病可無虞今日不必再投藥餌矣翼日復診神氣雖淸苔色將黑孟英

與肅肺蠲痰息風充液之劑。熱退而苔色鬆浮。孟英曰。舌將蛻矣。仍與前藥。越宿視之。苔果盡褪。宛如脫液之舌。且嘔惡時作。大解未行。孟英於甘潤生津藥內。仍佐竹茹竹瀝柿蒂海蛇數劑。嘔止便行。而舌上忽布白腐之苔。（此濕熱薰蒸於肺也。）以及齒齦脣頰。滿口徧生。揩拭不去。人皆異之。孟英堅守肅清肺胃。仍佐茹瀝。加橄欖銀花建蘭葉。數劑白腐漸以脫下。舌色始露。惟啜粥則胸次梗梗不舒。夜不成寐。孟英曰。胃汁不充。熱痰未淨也。仍守前議。病家疑之。復商於瘦石。瘦石云。勿論其他。即如滿口腐苔。酷似小兒鵝白。大方證甚屬罕見。苟胸無學識者。見之必按劍而詫。今醫

者有不惑之智。而病家乃中道生疑。豈求愈之道耶。沈大愧服。

一遵孟英設法。既而吐痰漸少。納穀頗適。兩脇又添辣痛。孟英

診脉左關弦數。曰必犯忿怒矣。詰之果然。加巵棟旱蓮女貞生

白芍綠萼梅等數服。各恙皆安。膚蛻成片。而右腿腫痛不能屈

伸。或疑風氣。思用艾灸。孟英急止之曰。此陰虧耳。誤灸必成廢

疾。吾以妙藥奉贈。但不許速效也。疏方以西洋參熟地黃蓯蓉

桑葚石斛木瓜歸芍二冬杞菊棟實牛膝加無核白蒲桃乾爲

劑。久服果得向愈。越三載以他疾終。

孫執中於春前四日。忽患鼻衂如注。諸法莫塞。寅夜請孟英視

之脈絃而數曰冬煖氣泄天令不主閉藏今晚雷聲大震人身應之肝陽乃動血亦隨而上溢不可以其體肥頭汗畏虛脫而進溫補也投以元參生地犀角牡蠣知母生白芍牛膝茯苓側柏葉童溺諸藥一劑知二劑已旣而脇痛流乳人皆異之孟英與甘露飲加女貞旱蓮龜板鼈甲牡蠣而瘳

王氏醫案續編卷一完

此案步步合法特少一番蕩滌之功故覺少延時日耳然涼劑已投其參若加蕩滌之品必不致瀰此治病之所以難也

王氏醫案續編卷二

原名仁術志

古杭王士雄孟英醫案

秀水盛鈞少雲
錢塘周鑅光遠 續輯

莊芝階舍人之外孫汪震官春前陡患赤痢。孟英診之。脈滑數而沈。面赤苔黃。手足冷過肘膝。當臍鞕痛。小溲濇少。伏熱爲病也。(此大實證何不加大黃蕩滌之)與大劑芩連梔楝滑石丹皮砂仁延胡查麴銀花草決明等藥。(清熱之發溫熱下注也若於前方加大黃蕩滌當不玉此)兩服手足漸溫。而脚背紅腫起疱如蒲桃大一二十枚。四服後腹痛減。苔退而渴。於原方去查麴砂仁。加白頭翁赤芍海蛇。

熱久傷陰也古人急下存陰之法原以防耗液法好

旬日後痢色轉白而腿筋抽痛乃去丹皮滑石赤芍加雞金橘紅生苡石斛兩服痛止溲長糞色亦正腳疱潰黃水而平數食遂安改用養胃陰清餘熱之法而愈聞孟英治此證每劑銀花輒兩許尚須半月而瘳設病在他家焉能如此恪信苟遇別手斷無如此重劑況在冬春之交誠古所未有之痢案後人恐難企及

吳馥齋室新產後嘔吐不止湯水不能下噦頭痛痰多苔色白滑孟英用蘇梗橘半吳萸茯苓旋覆薑皮柿蒂紫石英竹茹一劑知二劑已

此痰飲挾肝氣上逆也故方以降氣滌飲為治

此證明明虛寒何以作虛寒治不效蓋虛寒乃此人之本體而痰咳乃新受之外邪不治其邪而但補其虛則邪無出路以致積補生熱此舌胎之所以黃膩也孟英以清熱化痰爲治何是一半治病一半治藥誤也

鄭嫗患咳嗽自覺痰從腰下而起吐出甚冷醫作腎虛水泛治漸至咽喉阻塞飲食礙進卽勉強嚥之而胸次梗不能下便溏溲頻無一人不從虛論孟英診曰脈雖不甚有力右部微有粒滑苔色黃膩豈屬虛證以葦莖湯合雪羹加貝母知母花粉竹茹麥冬枇杷葉柿蒂等藥進十餘劑而痊

滿洲少婦懷娠漏血醫投補藥漏如故間或不漏則吐血延踰二載腹中漸動孕已無疑然血久溢於上下甚至納食卽吐多醫不能治孟英診之脈滑數有力是氣實而血熱也證不屬虛補藥反能助病愈補愈漏胎無血蔭而不長其所以不墮者氣

分堅實耳與大劑清營藥血溢遂止而稀沫頻吐得飲卽嘔口渴心忡氣短似促乃用西洋參麥冬知母石斛枇杷葉竹茹柹蒂生白芍木瓜重加烏梅投之覆杯卽安次日能喫飯矣（清肅柔肝養營生津[illegible]）

珠小輝太守令媛驟患頤腫連及唇鼻（此俗所謂蝦蟆瘟也）乃至口不能開舌不得出孟英視之曰溫毒也用射干山豆根馬勃羚羊薄荷銀花貝母花粉杏仁竹黃爲劑（傚普濟消毒飲意）升以紫雪搽於唇內錫類散吹入咽喉外將橄欖核磨塗腫處果吐韌涎而腫漸消詰朝卽啜稀粥數口而愈

一男子患便血醫投溫補血雖止而反泄瀉浮腫延及半年孟

英診之脈數舌絳曰此病原溼熱溫補飜傷陰液與芩連梔芍桑葉丹皮銀花石斛楝實冬瓜皮鼈甲鷄金等藥旬餘而愈

陸厚甫室陳芷濤主事之女也產後經旬偶發脘痛專用與溫脘痛何以投溫補不問可知其誤矣補藥因寒熱氣逆自汗不寐登圊不能解而臥則稀水自流口渴善嘔杳不納穀僉云不起矣乃父速孟英診之脈弦數而滑產後所患大都以陰虛肝失血養故脘痛生曰本屬陰虧肝陽侮胃誤投溫補澀滯之劑氣機全不下降以致諸證蠭起醫者見而卻走是未明其故也與沙參竹茹楝實延胡梔連橘貝杏斛枇杷葉爲肅肺以和肝胃法覆杯卽安但少腹隱隱作痛於前方去杏貝竹茹加知母花粉茯苓白芍橘

核海蛇乃解宿垢而瘳（此痰病之根）

周子朝患惡寒頭痛發熱酷似傷寒而兼心下疼脹孟英脈之右部沉滑苔黃不渴溲如蘇木汁（先解表）先以葱豉湯加梔連杏貝蔞橘爲方服後微汗而不惡寒反惡熱雖湯飲略溫即氣逆欲死孟英曰客邪解矣清其痰熱可也（後清裏）與知母花粉杏貝旋滑斛橘杷茹茅根蘆根地栗海蛇等藥果吐膠痰甚多而納食漸復惟動則欲喘於肅上之中佐以滋下爲善其後而瘥

濮樹堂室懷妊五月患春溫口渴善嘔壯熱無汗旬日後始浼孟英視之見其煩躁譫語苔黃不燥曰痰熱阻氣也病不傳營

孟英於溫熱痰伏濕有心得故遇此等證如摧枯拉朽合觀諸案可以得治溫病之法

血藥禁用試令按其胸次果然堅痛而大解仍行法當開上用小陷胸加石菖蒲枳實杏貝茹鬱梔麴等藥蘆菔湯煎服服二劑神情即安四帖心下豁然惟心腹如烙嘔吐不納改投大劑甘寒加烏梅頻啜漸康秋間得子亦無恙

胡振華以花甲之年患溺後出血水甚痛自云溲頗長激似非火證孟英察脈有滑數之象與元參生地犀角梔楝槐蕊側柏知母花粉石斛銀花甘草梢綠豆等藥旬日而痊踰四載以他疾終

管氏婦自去秋患赤痢多醫罔效延至暮春孟英診脈弦數苔

凡厥逆脈伏之證其熱深藏多不易解非卓識定力不惑於論亦必搖於衆議矣

黃渴飲腹脹而墜五熱夜甚用白頭翁湯合金鈴子散加芩芍巵斛吞駐車丸浹旬而愈

濮樹堂室病孟英甫爲參愈而樹堂繼焉起卽四肢厥逆脈伏惡寒發熱頭痛左爲甚惟口渴因與葱豉二帖（解表）熱雖退脈仍伏四肢冷過肘膝大解頻行人皆疑爲虛寒孟英曰此證儼似陰厥然渴飲溲赤眞情已露豈可泥於一起卽厥而必定其爲寒乎徑投涼解熱果復發而肢冷脈伏如故幸病者堅信服藥不疑至第七日大便瀉出紅水溺則管痛嘔惡煩躁徹夜不瞑人更危之孟英曰熱邪既已下行可望轉機以白頭翁湯加銀花

通草芩芍茹滑知斛巵楝羚角之類投三日紅水始止四肢漸和頗有昏瞀譫語用王氏犀角地黃湯一劑四肢熱而脈顯滑數苔轉灰黃大渴遺溺病人自述如卧烘箱上於昨方加入元參銀花竹葉生石膏知貝巵斛服一劑夜間卽安寐而苔轉黑

陽越於上

燥於昨方復加花粉服一劑熱退而頭面汗多嬾言倦寐小溲

陰虛於下病已將愈何慮之有

欲解不通諸戚友咸以爲危各舉所知而羣醫僉云挽救不及病家皇皇孟英曰此證幸初起卽予診視得盡力以爲死裏求生之舉非比他人之病皆因誤治致危然不明言其險者恐病家惶惑而築室於道旁也今生機已得不過邪去眞陰未復但

當恪守予法自然水到渠成切勿二三其德以致爲山虧簣賴有一二知音竟從孟英議服西洋參生地葳蕤麥冬楝芍知斛藥一劑溺行索粥再服而黑苔退三服而神清音朗舌潤津回唯有軟痰不能吐左偏頭微痛於原方加二至桑菊貝母牡蠣又復五劑得解鞭矢一次各恙始安眠食漸適而瘳

陳足甫溲後見血管痛異常減餐氣短孟英以元參生地知母楝實銀花側柏葉卮子桑葉丹皮綠豆爲方藕湯煎服二劑病大減乃去丹皮柏葉加西洋參熟地服之而瘥（伏暑在內香燥可以益熱）

王開榮偶患腹中絞痛自服治痧諸藥而大便瀉血如注孟英

診之左頫和右關尺甚大而滑（弦滑者痰也大者熱也）面色油紅喘逆不寐與葦莖湯合金鈴子散加銀花側柏葉巵斛芩連二帖後面紅退血亦止乃裁柏葉銀花加雪羹枯荷稈又二帖始發熱一夜得大汗周時而腹之痛脹爽然若失卽能安寐進粥改投沙參知母花粉桑葉杷葉石斛白芍橘絡杏仁冬瓜子茅根荷稈三帖大解行而脈柔安穀

陳叟久患痰嗽氣逆（肺氣不清）夏初因惡寒自服理中湯（熱結在腑）遂痰中帶血氣喘而厥二便不通冷汗腹脹孟英察脈洪大按腹如烙與葦莖湯加巵楝旋貝花粉海蛇外以田螺大蒜車前草擣貼臍下卽

溺行而平
高某患兩膝後筋絡痠疼略不紅腫臥則痛不可當徹夜危坐
孟英切脈虛細苔色黃膩咽燥溺赤與知斛卮楝牛膝豆卷桂
枝竹瀝爲方送虎潛丸旬日而瘳
楊某方作事不知背後有人潛立回顧失驚遂不言不食不寐
不便別無他苦孟英按脈沈絃以石菖蒲遠志琥珀膽星旋貝
竹黃杏仁省頭草羚羊角爲劑化服蘇合香丸二帖大解行而
啜粥夜得寐而能言復與調氣寧神蠲飲藥數日霍然
趙聽樵令妹每汛至則腹脹嘔吐腰脊痠疼兩腿腫痛筋掣脘

俱肝氣橫逆之證其發於汛期者肝失所藏也疏泄既平肝經虛而後養血柔肝亦先標後本之法

病不甚重治亦合法而難收捷效者以陰虛之體不勝溫熱之氣也此即四損不可正治之例設治不如法則危矣

疼甚至痙厥多藥不效孟英以金鈴子散合左金加二陳竹茹枳實桂苓數劑而愈續用蓯蓉菟絲淫羊杜仲桑甚木瓜續斷香附歸芍茴楝調之汛至如期略無痛苦初冬適楊子楔尋即受孕

濮東明令孫女素稟陰虛時發夜熱少餐不寐仲夏患感發疹汛不當期而至孟英用犀羚知貝石膏生地巵麴花粉甘草竹葉蘆根等藥疹透神清唯鼻燥異常吸氣入喉辣痛難忍甚至肢冷復於方中加元參竹茹菊葉荷桿各患始減而心忡吐沫徹夜不瞑渴汗便溏改投西洋參生地麥冬小麥竹葉黃連眞

葉氏云溫邪中人首先犯肺其次則入心正此病也

珠百合貝母石斛牡蠣龜板蔗汁諸藥而愈季秋適姚益齋爲室金亞伯廷尉簉室產後惡露不行渴瀉痰多孟英以北沙參滑石生薏苡生扁豆蛤殼豆卷石斛竹茹枇杷葉琥珀茯苓等藥數劑而愈

顧竹如孝廉令嫂患感十餘日耳聾不語昏不識人而客未入室彼反先知（熱極而神外越）醫以爲祟凡犀角地黃牛黃淸心復脈等湯徧服（藥不誤特病重藥輕耳）無效已摒擋後事矣所親濮根厓囑其延診於孟英脈至澀數（下證已悉備矣）舌不能伸苔色黃膩遺溺便祕目不交睫者已四晝夜胸腹按

雖不用下劑而通經透絡之品大劑用之亦足以蕩滌邪穢

之不柔與白虎湯去米草加石菖蒲元參犀角鼈甲花粉杏仁竹葉竹黃竹瀝投一劑即譫語滔滔渠父母疑藥不對病孟英曰不語者欲其語是轉機也再投之大渴而喜極熱之飲又疑涼藥非宜孟英姑應之曰再服一劑更方可也三投之痰果漸出吐四劑後舌伸便下神識漸清乃去菖蒲石膏犀角鼈甲加生（病後陰虛液耗陽亢痰盛數其陰轉方甚合法）地石斛麥冬貝母數帖熱盡退而痰味甚鹹又去杏貝竹黃加西洋參牡蠣龜板茯苓服之全愈踰年失怙繼遭祝融鬱損情懷誤投溫補至戊申年殞

邵魚竹給諫患感楊某作瘧治不應始迓孟英診之脈爽汗多（熱為遲所）

時故脈耎

熱不甚壯苔色厚膩嘔惡煩躁痰多腿痠顯是溼溫因謂其令郎子旗曰溼溫者溼蘊久而從時令之感以化熱也不可從表治更勿畏虛率補與宣解一劑各恙頗減奈衆楚交咻謂病由心力勞瘁而來況汗多防脫豈可不顧本原羣醫附和遂服參耆滋塗熱。宜乎不救。歸熟地之藥病日以劇最後吳古年診之云此溼溫也何妄投補劑然已未從挽救交十四日而殞始悔不從王議

康康侯司馬之夫人久傷謀慮心火外浮面赤齒疼因啖西瓜此寒涼鬱閉。其熱也。用辛通淡滲之劑。斯愈矣。遂脘悶不舒喜得熱按泄瀉不饑自覺舌厚數寸苔色灰膩孟英與厚朴滑石葱白薤白枇杷葉橘皮薄荷旋覆省頭草一劑

霍然。

葉杏江仲郎。患發熱泄瀉（肺移熱於大腸）醫治十七日不效。骨瘦如豺。音嘶氣逆。所親許芷卿薦孟英診之。脈數大渴汗多苔黃。以竹葉石膏湯加減十餘劑。漸以向愈。大解反極堅燥。繼與滋養而康。

張某患發熱。醫知其非寒邪也。用清解藥數帖。腿痛異常。身面漸黃。孟英診之脈滑實。腹脹口乾。與茵陳大黃湯兩劑。便行而各恙霍然。

魏女患腳腫嘔吐。寒熱便祕。孟英與龍膽瀉肝湯而立效。繼有孫氏婦患此。亦以是藥獲痊。

此亦肝經鬱熱之證孟英善於調肝故應手輒效

渴媪患左目胞起瘰纍而痛及眉稜額角巔頂腦後筋掣難忍醫投風劑其勢孔亟孟英診脈弦勁舌絳不饑與固本合二至桑菊犀羚元參牡蠣鼈甲白芍知母石斛丹皮細茶等出入互用匝月始愈

濮媪於酷熱之秋渾身生瘡如疔痛楚難堪小溲或祕或頻大便登圊則努掙不下臥則不能收攝人皆謂其虛也（未聞虛而生瘡者）孟英診脈滑數舌紫苔黃而渴與白虎加花粉竹葉巵子白薇紫菀石斛黃蘗十餘劑而痊

姚小蘅太史令姪女初秋患寒熱而汎適至醫用正氣散兩帖

遂壯熱狂煩目赤譫語甚至欲刎欲縊勢不可制孟英按脉洪滑且數苔色乾黃尖絳臍間腹脹拒按畏明口渴氣逆痰多與桃仁承氣湯加犀角石膏知母花粉竹瀝甘菊人謂熱雖熾而汛尚行何必大破其血而又加以極峻之藥哉孟英曰叟勿過慮恐一二劑尚不足以濟事果服兩大劑始得大便而神清苔化目赤亦退改用甘寒以清之繼而又不更衣即脉滑苔黃而腹脹更與小承氣湯二帖便行而各恙遄已數日後又如此仍投小承氣湯二帖凡前後六投下劑才得波浪不興漸以清養而瘳季秋適江右上高令孫明府之子沛堂爲室

緊熱入血室例治

董曉書令正素患脘痛甚至暈厥今秋病腰疼腿木胸悶氣逆不能臥胡某進溫補藥而喘汗欲脫杳不思穀孟英切脈虛細滋陰調肝而不呆膩中兼有弦滑舌絳而渴乃陰虛挾痰耳與沙參蓯蓉木瓜石斛飲利痰而不燥此孟英獨擅之秘蛤殼蒺藜石英茯苓紫菀杏仁楝實首烏牛膝諸藥旬日而安繼加熟地黃服之全愈

王葦塘患滯下醫投枳朴檳查之藥數服後肢冷自汗杳不進穀脘悶腹痛小溲牽疼舉家皇皇孟英視脈細澀舌絳無津是高年陰虧伏暑傷液況平昔茹素胃汁不充加以燥烈之藥津滋陰養液兼調肝氣何以堪因與沙參銀花蓯蓉白芍石斛木瓜甘草楝實扁豆花

鮮稻頭數劑痛悶漸去汗止肢溫乃加生地阿膠麥冬柿餅蒲桃乾等以滋之居然痢止餐加惟舌色至匝月始津潤復常陰液之難充也如此

沈綬齋令堂患滯下色白醫與溫運病勢日劇腹脹昏瞀湯飲不下孟英診爲伏暑用芩連滑朴等藥沈疑高年且素患脘痛豈可輒用苦寒孟英再四剖陳始服半劑病果大減不數帖即愈按此等證甚多奈執迷不悟者雖剴切言之不能解其惑亦可哀也已

一叟患滯下色白不黏不饑不渴腹微痛而不脹孟英切脈遲

微進大劑真武湯加參而愈

程秋霞子患腦漏（膽、移、熱。於。肝 方書所載不。過如此。）醫與辛夷蒼耳之藥漸有寒熱改用柴葛羌防數帖遂致寒熱日發數次神昏自汗勢甚可危孟英用竹葉石膏湯（肅。清。肺。氣。）一劑寒熱退而神清進粥繼以甘涼清肅復投滋潤填（上。病。取。下。）陰旬日而健

朱浚宣令堂患滯下醫聞色白而與升提溫補旬日後肢冷自汗液脫肛墜挐醫束手慮其虛脫因浼濮樹堂乞診於孟英曰藥誤耳與大劑行氣蠲痰清熱之藥果漸吐痰而痢愈又其令弟同時患此五色並見神昏肢搐大渴莖腫腹痛夜熱危險異

常。孟英察脈細數。與白頭翁湯加犀角生地銀花石斛楝實延胡芩連滑石丹皮木通甘草梢等藥。三帖後熱退神清。溺行搐止。乃去犀角草梢丹皮滑石木通。加砂仁拌炒熟地山查炭。服之漸安。半月而愈。

姚小蘅大令。患瘧寒微熱甚。日作二次。汪某與柴胡藥二帖。勢遂劇。舌絳大渴。小溲全無。孟英曰。津欲涸矣。與西洋參生地知母花粉石斛麥冬梔子百合竹葉。投之五劑而瘧止。越三載。以他疾終。其簉室同時患此。嘔吐脇痛。畏寒不渴。苔色微白。孟英與小柴胡湯。三飲而瘳。

孫渭川年踰七旬脈象六陰按之如無偶患音嘶痰嗽舌絳無津孟英用甘涼清潤法音開而嗽不已仍與前藥轉爲滑下色醬溺赤臍旁堅鞕按之趯趯舌猶枯絳渴飲不饑人皆危之孟英曰藏熱由府而出痢不足慮第高年陰液難充不能舍凉潤（此證甚精）爲方苟犯溫燥其敗可必幸渠家平素恪信竟服犀角地黃知母銀花茯蓉花粉麥冬白芍石斛楝實等藥十餘劑痢止而臍旁柔輭因去犀角加西洋參又服兩旬始解燥矢而溲澈胃甦又服半月復得暢解舌亦潤澤而愈（此肝腎之燥非痢也）

王耕藍室素患脘痛近發寒熱醫與溫補漸至胸痞嘔呃譫語

神昏舌絳面赤足冷自汗瘧仍不休孟英用元參犀角石膏石金是救逆補之誤藥開鬱降痰化然故本病亦愈菖蒲連翹杏仁貝母旋覆竹茹枇杷葉竹黃柿蒂竹瀝鬱金諸藥化服萬氏牛黃清心丸數服而愈

潘騂行在外患瘧買舟歸就孟英視曰苔膩脈弦伏邪所化不與正瘧同科風寒藥一味不可犯薑棗湯一滴不可啜與知芩橘半滑朴杏斛花粉省頭草一劑而病若失此等案極多姑載一二

張與之令堂久患痰嗽礙臥素不投補藥孟英偶持其脈曰非補不可與大劑熟地藥一飲而睡與之曰吾母有十七載不能

瘧亦分經而治若陽明瘧正以白虎湯爲主劑豈有專守一小柴胡而能愈病者

服熟地矣君何所見而重用頤投孟英曰脈細痰鹹陰虛水泛非此不爲功從前服之增病者想必雜以參术之助氣昔人云勿執一藥以論方故處方者貴於用藥之恰當病情而取舍得宜也

陳足甫室懷妊九月而患瘧目不能瞑口渴自汗便溏氣短醫進育陰清解法數劑不應改用小柴胡一帖而咽疼舌黑心頭絞痛乃翁仰山聞之疑其胎壞延孟英過診曰右脈洪滑雖舌黑而胎固無恙也病由伏暑育陰嫌其滋膩小柴胡乃正瘧之主方古人謂爲和劑須知是傷寒之和劑在溫暑等證不特手

足異經而人參半夏薑棗皆不可輕用之藥雖有黃芩之苦寒而仲聖於傷寒之治猶有渴者去半夏加栝蔞根之文古人立方之嚴密何後人不加體察耶投以竹葉石膏湯四劑瘧止便秘口渴不休與甘涼濡潤法數帖忽腹鳴泄瀉或疑寒涼所致孟英曰吾當以涼藥解之人莫識其意問難終朝語多不備錄果以白頭翁湯兩啜而愈迨季秋娩後發熱不蒸乳惡露淡且少家人欲用生化湯孟英急止之曰血去陰更傷豈可妄疑瘀停而攻之與西洋參生地茯苓石斛女貞旱蓮甘草爲大劑數日而安繼因觸怒少腹聚氣如瘕㽿痛夜甚人又疑爲涼藥凝

痧所致孟英力為辨折與橘核橘葉橘絡楝實茯苓木香巵炭
烏藥絲瓜絡海蛇藕石斛兩頭尖等藥外以葱頭擣爛貼之兩
帖後腹中雷鳴周身汗出而痛止人見其汗慮為虛脫急追孟
英視之曰此氣行而病解矣但脈形細數陰津大傷苔黃苦渴
亟宜潤補奈樞機窒滯滋膩難投且以濡養八脈為法服之各
恙皆彌眠食漸適緣平素多鬱易犯痧氣頻發脘痛屢次反復
孟英竭力圖維幸得轉危為安漸投滋補而愈

胡季權子珍官甫六歲目患內障繼則夜熱痰嗽小溲過多醫
作童損治服滋補數月病日以甚孟英持脈右大口渴苔黃曰

伏熱在肺。法當清解。及詳詰其因。始言病起瘄後。蓋餘熱未淨而投補太早。與滑石。知母。花粉。桑葉。茅根。枇杷葉。蘆根。冬瓜子。杏仁服二劑。徧身發出斑塊。又二劑。斑退苔化。乃去滑石。加沙參餌之。其熱頭面先退。次退四肢。以及胸背。又數日甫退於腹。人皆詫其熱退之異。孟英謂熱伏既久。復爲半年之補藥膩滯於其間。焉能一旦盡滌。其勢必漸清而漸去也。熱退既淨。渴亦有節。痰嗽遞減。餐加肌潤。而內障亦漸除矣。

顧奏雲季秋患感。醫作虛治。補及旬日。舌卷痙厥厥以下不能略動。危在須臾。所親石誦羲延孟英設死裏求生之策。察脈虛

促欲絕先灌紫雪一錢隨溉犀角地黃湯二大劑服下厥雖止而舌腭滿黑目赤如鳩仍用前湯三日間計服犀角兩許黑苔漸退神識乃清而呃忒頻作人猶疑其虛也孟英曰營熱雖解氣道未肅耳以犀角元參石花連翹銀花竹茹知母花粉貝母竹葉爲方服之次日即下黑韌矢甚多而呃忒止又三劑連解膠黑矢四次舌色始潤略進米飲腿能稍動然臀已磨穿矣與甘潤育陰藥續解黑矢又五次便溺之色始正投以滋養日漸向安己酉舉於鄉其弟翰雲患左胯開腫鞕而疼暮熱溺赤舌絳而渴孟英按脈細數陰虛內熱徑用西洋參生地麥冬楝實知母花粉

銀花連翹甘草黃蘗等藥服旬餘而愈

康康侯司馬令郎爾九在玉環署中患心忡自汗氣短面赤露時溲溺數十次澄澈如水醫僉謂虛補之日劇乃來省就孟英診焉左寸關數右絃滑心下似阻因作痰火阻氣心熱移肺治用蛤殼黃連枳實楝實旋覆花粉橘紅杏仁百合絲瓜絡冬瓜子海蛇葧臍竹茹竹瀝梨汁等出入爲方服之良愈而司馬爲職守所羈嘗患恙函請孟英診視者再因竟不克往繼聞司馬於冬仲竟卒於甌乃知病而得遇良手原非偶然前歲遇而今歲不能致豈非命也耶

許自堂令孫子社患感延至秋杪證交二十八日諸醫束手渠伯母鮑玉士夫人薦孟英診之左部數右手儼若魚翔痰嗽氣促自汗痰瘀苔色灰厚渴無一息之停垂危若是而皓首之祖孀母少妻相依為命環乞拯救甚可憫也孟英曰據脈莫能下手吾且竭力勉圖第恐一齊衆楚信任不堅則絕無可望之機矣其母長跽而言曰唯君所命雖砒鴆勿疑也於是先以竹葉石膏湯加減至五劑氣平嗽減汗亦漸收苔色轉黑舌尖露絳改投元參生地犀角石膏知母花粉竹葉銀花等藥又五劑痰瘀漸減舌絳漸退彼婦翁召羽士為其拜斗飛符噀水鼓樂喧

閱病者卽譫妄不安神昏如醉羽士反爲嚇退貧夜速孟英視之與紫雪錢餘神卽清爽仍用前方重加竹瀝服八劑始解黑如膠漆之大便而黑苔漸退右脈之至數始清惟煩渴不減令其恣啖北梨舌纔不燥痰出亦多又六劑舌色乃淡溲出管痛熱邪得從下行矣凡十二日之間共服大劑寒涼已二十四帖計用犀角三兩有奇而險浪始平續以前法緩制服六劑又解黑矢五次手足始知爲已有又五劑筋絡之振惕始定略能側臥譫語乃息漸進稀糜繼灌甘潤充其胃汁七八劑後渴止知非此無以善其後餓脈皆和緩又浹旬穀食乃復又旬餘便溺之色始正前後共

下黑矢四十餘次苔色亦淨授滋塡善後而康是役也凡同道暨許之族人戚友莫不以爲秋冬之交用藥偏寒況病延已久敗象畢呈苟不卽投峻補必致失手旣聞鮑夫人云歸許氏二十餘年目擊多人無不死於溫補此等病曾見之此等藥蓋未嘗聞也孰知如此之證有如此之治求之古案亦未前聞傳諸後賢亦難追步蓋學識可造而膽堅非人力所能及此孟英所以爲不世出之良醫也

段春木秋杪（外感濕邪）患發熱而腰腿（真陰內損）痛如刀割孟英視之略不紅腫脈（熱傷少陰）至細數苔色黑燥溺赤便黑與西洋參麥冬生地犀角銀花楝

貫石斛知母甘草竹瀝蔗汁爲大劑投之熱漸退痛漸已惟舌

（喉痛也）

絳無津仍與甘凉濡潤爲方數日後忽舌絳倍加燥及咽膈水飲不能下嚥孟英曰眞陰涸竭藥難奏績矣然竊疑其何以小愈之後驟爾陰枯或者背予而服別藥乎繼其契友來詢云段死而舌出此曷故歟孟英聞之爽然大悟因擷傷寒女勞復之文示之其人頓足云良然彼於小愈後曾宿於外次日歸卽轉劇苟直陳不諱或尙可治孟英曰未必然也燒裩散鼠矢湯皆從足少陰以逐邪不過熱邪襲入此經所謂陰陽易是也今少腹無絞痛之苦原非他人之病易於我眞是女勞之復以致眞

陰枯涸更將何藥以駁復其眞陰哉然從此而女勞復與陰陽易一虛一實有定論不致混同而談治矣

顧昇庵參軍之仲郎久患多疑善恐不出房者數年矣食則不肯與人共桌臥則須人防護寡言善笑時或遺精多醫廣藥略無寸效孟英切脈甚滑數與元參丹參竹黃竹茹丹皮黃連花粉巵子海蛇荸薺爲劑送服當歸龍薈丸四帖卽能出署觀劇遊淨慈而登吳山參軍大喜歎爲神治次年爲之配室

陳某偶患溏泄所親鮑繼仲云余往歲患瀉治不中肯延逾半載幾爲所困今秋患此服孟英方數劑霍然故服藥不可不愼

也盡延孟英治之陳因中表二人皆知醫招而視之以爲省便慨投以溫補健脾之藥數日後瀉果減而發熱（熱得補而不行）昏痙咽喉黑腐其居停瞿穎山疑病變太速囑其請援於孟英孟英診曰遲矣病起泄瀉何必爲寒正是伏邪自尋出路而溫補以固留之自然內陷厥陰不可救藥果卽殞焉繼有高小垞孝廉令弟兩生因食蟹患瀉黃某用大劑溫補藥瀉果止而頸筋痠痛舌絳嘔渴口氣甚臭孟英持脈沈數曰食蟹而後瀉會逢其適耳脈證如斯理應淸潤奈病人自畏凉藥復質於吳某亦主溫補服及旬日昏痙舌黑而斃

此肝氣挾停飲上逆也緣素嗜瓜果胃陽久傷故於平肝滌飲之中加參以扶胃氣

金某久患脘痛按之漉漉有聲便祕溲赤口渴苔黃杳不知饑絕粒五日諸藥下嚥傾吐無餘孟英察脈沈弱而弦用海蛇葧臍各四兩煮湯飲之徑不吐痛亦大減繼以此湯煎高麗參黃連楝實延胡梔子枳椇石斛竹茹柿蒂等藥送服當歸龍薈丸旬日而安續與春澤湯調補收績盡其人善飲而嗜瓜果以成疾也

喬有南年三十九歲患牝瘧二旬醫治罔效所親徐和圃疑爲伏暑延孟英往診脈微無神倦臥奄奄便祕半月溺赤不饑痰多口甘稍呷米飲必揉胸搥背而始下苔色黑膩而有蒙茸之

象乃曰此精氣神三者交虛之證不可與時行伏暑晚發同年而語也幸前手之藥法主運中尚無大害與參朮桂附沈香拌炒熟地鹿角石英蓯杞歸茯杜仲棗仁菟絲山茱橘皮霞天麴胡桃肉等出入爲大劑投十餘帖寒後始有熱而面色乃退口不作渴甘痰亦日少粥食漸加卽裁桂附白朮加石斛又服七劑解黑燥大便甚多凡不更衣者四旬二日矣寒熱亦斷安穀浚澄而竟愈或謂先生嘗警人溫補之非何一旦放手而大用孟英曰溫補亦治病之一法何可廢也第用較少耳世之醫者眼不識病僅知此法可以媚富貴之人動手輒用殺人無算豈

非將古人活世之方翻為誤世之藥可不痛恨耶

此與前案虛實相反正可對看

陳嫗患牝瘧月餘腹脹便祕噯多不饑口淡脈滑孟英主連楝橘貝杏茹旋菀杷蒺為方數劑即瘳

孟英治其令弟季傑之篷室因夜間未寐侵晨飲酒解寒適見人爭誶即覺心跳欲吐家人疑其醉也而欲吐不出氣即逆奔如喘且肢麻手握語言難出又疑為急痧而欲刺之孟英聞而視之脈象弦駛曰夜坐陽升飲醉則肝陽益浮見人爭誶是驚則氣更上逆不可刺也灌以蘇合香丸一顆下嚥即瘥

此恐是痰閉氣結之故蘇合丸辛香通氣故愈若是肝浮氣逆益以辛竄之藥安能愈乎

黃詮吉截瘧後患浮腫趙某聞其體素虛切其脈弦細遂用溫

補劑致呃忒不休氣衝礙臥飲食不進勢瀕於危請孟英決其

及返餘杭否孟英曰脈雖弦細而有力子必誤服溫補矣肯服

吾藥猶可無恐因與栝蔞薤白合小陷胸橘皮竹茹湯加柿蒂

旋覆蘇子香附赭石紫菀杷葉爲方四劑而瘳

吳馥齋室春間娩子不育汛事亦未一行偶患嘔吐發熱眩暈

心嘈大解溏泄口渴溲痛或疑其娠或疑爲損孟英診曰產及

一載而經不至腹不脹脈弦緩非娠非損乃血虛痰滯而感冬

溫也以羚羊淡豉竹茹白薇梔子杷葉知母葱白花粉投之三

劑熱退吐止去葱豉羚羊加生地甘草橘皮調之而愈

當歸龍薈丸
當歸 龍膽草 山梔 黃連
黃柏 黃芩 大黃 青黛
蘆薈 木香 麝香
丸

盛犀林廣文之僕患血痢自秋徂冬半年罔效孟英察脈細弱而口乾腰膝痠疼與鹿角霜蓯蓉枸杞杜仲菟絲續斷血餘石脂木瓜砂仁末炒熟地黃十餘劑而痊

徐月巖室患周身麻木四肢癱瘓口苦而渴痰冷如冰氣逆欲嘔汛愆腹脹頻飲極熱薑湯似乎暢適深秋延至季冬服藥不愈孟英診脈沈弦而數曰溺熱如火乎間有發厥乎病者唯唯遂以雪羹旋覆梔楝茹斛知母花粉桑枝羚羊橄欖蛤殼爲方送下當歸龍薈丸服之遞效二十劑即能起榻乃去羚豬加西洋參生地蓯蓉藕投之漸愈

張肖江妹暮冬患感朱某進溫散藥數服病日劇比孟英視之目瞪不語面赤氣逆晝夜需人抱坐四日不著枕矣乃冬溫挾痰誤提而氣不肅降也以旋赭杏貝花粉茅根冬瓜子紫苑薤白婁仁蘇子石菖蒲竹瀝爲劑蘆菔湯煎三帖大便行而能臥矣自言胸中迷悶改用小陷胸合三子養親加沙參知母旋貝竹茹枇杷葉數劑熱退知饑而愈嗣有王炳華子患感某用溫散藥而氣逆礙臥四明老醫王秉衡作腎虛不能納氣治連服大劑溫補喘嗽益劇面浮跗腫檯肩自汗大渴脇痛乞治於孟英已半月不交睫矣診其脈右部弦大而强舌根黑苔如煤

者兩條面黎形瘦幸而大解溏泄得能消受許多誤藥徑與旋赭黃連枳實括蔞蘇子杏仁紫苑生石膏蘆菔汁六大劑始能就枕而大渴不止脘腹反形痞脹按之堅痛乃去旋赭少加白芥子半夏薤白兼令日啖北梨數十枚服旬日胸腹皆舒苔色盡退唯嗽未已改用西洋參杏貝蘆根知母冬瓜子花粉柿霜杷葉竹瀝十許劑嗽止而跗腫渴瀉亦皆霍然矣凡啖梨三百餘斤聞者莫不詫異

王氏醫案續編卷二完